

表 360 1988年導入患者治療方法, 性別(2014年末)

| 治療方法   | 男性      | 女性      | 合計      | 記載なし | 総計      |
|--------|---------|---------|---------|------|---------|
| 施設血液透析 | 551     | 478     | 1,029   |      | 1,029   |
| (%)    | (70.5)  | (67.5)  | (69.1)  |      | (69.1)  |
| 血液透析濾過 | 196     | 200     | 396     |      | 396     |
| (%)    | (25.1)  | (28.2)  | (26.6)  |      | (26.6)  |
| 血液濾過   |         |         |         |      |         |
| (%)    |         |         |         |      |         |
| 血液吸着透析 | 31      | 29      | 60      |      | 60      |
| (%)    | (4.0)   | (4.1)   | (4.0)   |      | (4.0)   |
| 在宅血液透析 | 3       | 1       | 4       |      | 4       |
| (%)    | (0.4)   | (0.1)   | (0.3)   |      | (0.3)   |
| 腹膜透析   | 1       |         | 1       |      | 1       |
| (%)    | (0.1)   |         | (0.1)   |      | (0.1)   |
| 合計     | 782     | 708     | 1,490   |      | 1,490   |
| (%)    | (100.0) | (100.0) | (100.0) |      | (100.0) |
| 記載なし   |         |         |         |      |         |
| 総計     | 782     | 708     | 1,490   |      | 1,490   |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査