

表 373 2001年導入患者治療方法, 性別(2014年末)

| 治療方法   | 男性      | 女性      | 合計      | 記載なし | 総計      |
|--------|---------|---------|---------|------|---------|
| 施設血液透析 | 3,332   | 2,332   | 5,664   |      | 5,664   |
| (%)    | (80.9)  | (81.3)  | (81.1)  |      | (81.1)  |
| 血液透析濾過 | 730     | 503     | 1,233   |      | 1,233   |
| (%)    | (17.7)  | (17.5)  | (17.7)  |      | (17.7)  |
| 血液濾過   |         | 1       | 1       |      | 1       |
| (%)    |         | (0.0)   | (0.0)   |      | (0.0)   |
| 血液吸着透析 | 6       | 8       | 14      |      | 14      |
| (%)    | (0.1)   | (0.3)   | (0.2)   |      | (0.2)   |
| 在宅血液透析 | 18      | 1       | 19      |      | 19      |
| (%)    | (0.4)   | (0.0)   | (0.3)   |      | (0.3)   |
| 腹膜透析   | 31      | 23      | 54      |      | 54      |
| (%)    | (0.8)   | (0.8)   | (0.8)   |      | (0.8)   |
| 合計     | 4,117   | 2,868   | 6,985   |      | 6,985   |
| (%)    | (100.0) | (100.0) | (100.0) |      | (100.0) |
| 記載なし   |         |         |         |      |         |
| 総計     | 4,117   | 2,868   | 6,985   |      | 6,985   |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査