

表 3857 現在施行中のPD歴(年) 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往	1年未満	1年～	2年～	4年～	6年～	8年～	10年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	1,130	909	1,326	764	371	172	215	4,887	7,302	12,189	3.34	3.19
(%)	(99.6)	(99.3)	(99.5)	(99.7)	(98.4)	(98.9)	(99.1)	(99.4)	(91.9)	(94.7)		
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	4	6	6	1	5	2	1	25	500	525	4.15	3.89
(%)	(0.4)	(0.7)	(0.5)	(0.1)	(1.3)	(1.1)	(0.5)	(0.5)	(6.3)	(4.1)		
あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)									16	16		
(%)									(0.2)	(0.1)		
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	1		1		1			3	65	68	3.89	3.29
(%)	(0.1)		(0.1)		(0.3)			(0.1)	(0.8)	(0.5)		
あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)			1				1	2	65	67	8.38	4.89
(%)			(0.1)				(0.5)	(0.0)	(0.8)	(0.5)		
合計	1,135	915	1,333	766	377	174	217	4,917	7,948	12,865	3.35	3.20
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	8	1	12	9	6	5	5	46	258	304	5.26	4.37
記載なし	152	140	173	100	71	38	42	716	3,245	3,961	3.65	3.60
総計	1,295	1,056	1,518	875	454	217	264	5,679	11,451	17,130	3.40	3.27

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査