

表 545 専従専門医の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

総コレステロール 濃度	なし	あり	合計	記載なし	総計
100未満	30	20	50	1	50
(%)	(60.0)	(40.0)	(100.0)		
100～	67	93	160		160
(%)	(41.9)	(58.1)	(100.0)		
120～	172	276	448		448
(%)	(38.4)	(61.6)	(100.0)		
140～	308	498	806		806
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)		
160～	328	536	864		865
(%)	(38.0)	(62.0)	(100.0)		
180～	307	526	833		833
(%)	(36.9)	(63.1)	(100.0)		
200～	193	371	564		564
(%)	(34.2)	(65.8)	(100.0)		
220～	110	208	318		318
(%)	(34.6)	(65.4)	(100.0)		
240～	67	92	159		159
(%)	(42.1)	(57.9)	(100.0)		
260～	56	93	149		149
(%)	(37.6)	(62.4)	(100.0)		
合計	1,638	2,713	4,351	1	4,352
(%)	(37.6)	(62.4)	(100.0)		
記載なし	1,751	2,838	4,589		4,589
(%)	(38.2)	(61.8)	(100.0)		
総計	3,389	5,551	8,940	1	8,941
(%)	(37.9)	(62.1)	(100.0)		
平均	177.53	179.91	179.01	173.00	179.01
標準偏差	41.73	39.79	40.54		40.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査