

表 2127 HDF希釈方法 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)							255,641 (94.0)	255,641 (82.4)
血液透析濾過 (%)	30,529 (99.7)	5,859 (99.2)	5 (100.0)	1,589 (99.9)	37,982 (99.7)	1 (100.0)	5,300 (1.9)	43,283 (14.0)
血液濾過 (%)							92 (0.0)	92 (0.0)
血液吸着透析 (%)	2 (0.0)	4 (0.1)		1 (0.1)	7 (0.0)		1,623 (0.6)	1,630 (0.5)
在宅血液透析 (%)							521 (0.2)	521 (0.2)
腹膜透析 (%)	81 (0.3)	43 (0.7)			124 (0.3)		8,817 (3.2)	8,941 (2.9)
合計 (%)	30,612 (100.0)	5,906 (100.0)	5 (100.0)	1,590 (100.0)	38,113 (100.0)	1 (100.0)	271,994 (100.0)	310,108 (100.0)
記載なし								
総計	30,612	5,906	5	1,590	38,113	1	271,994	310,108

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査