

表 2294 治療方法 併用の状況別（透析患者全体、糖尿病あり患者）

併用の状況	施設血液透析	Off-line HDF	On-line HDF	Push/Pull HDF	ハイオフィルトレーション	血液濾過	血液吸着透析 （リクセル）	血液吸着透析 （その他）	在宅血液透析	腹膜透析 （CAPD）	腹膜透析 （APD）	腹膜透析 （CCPD）	合計	記載なし	総計
HD（F）単独 （％）	118,391 （99.9）	2,300 （100.0）	14,319 （99.9）	268 （100.0）	148 （99.3）	43 （100.0）	134 （100.0）	3 （100.0）	98 （100.0）				135,704 （97.5）		135,704 （97.5）
PD単独 （％）										1,612 （82.9）	889 （81.5）	257 （67.3）	2,758 （2.0）		2,758 （2.0）
HD（F）単独、PDカテ あり （％）	76 （0.1）		8 （0.1）										84 （0.1）		84 （0.1）
PD、HD併用週1 HD（F） （％）										291 （15.0）	181 （16.6）	110 （28.8）	582 （0.4）		582 （0.4）
PD、HD併用週2 HD（F） （％）	14 （0.0）		3 （0.0）							35 （1.8）	18 （1.6）	8 （2.1）	78 （0.1）		78 （0.1）
PD、HD併用週3 HD（F） （％）	14 （0.0）		3 （0.0）		1 （0.7）								18 （0.0）		18 （0.0）
PD、HD併用週4 HD（F） （％）															
PD、HD併用その他 （％）	4 （0.0）									7 （0.4）	3 （0.3）	7 （1.8）	21 （0.0）		21 （0.0）
合計 （％）	118,499 （100.0）	2,300 （100.0）	14,333 （100.0）	268 （100.0）	149 （100.0）	43 （100.0）	134 （100.0）	3 （100.0）	98 （100.0）	1,945 （100.0）	1,091 （100.0）	382 （100.0）	139,245 （100.0）		139,245 （100.0）
不明	5		1									2	8		8
記載なし															
総計	118,504	2,300	14,334	268	149	43	134	3	98	1,945	1,091	384	139,253		139,253

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
*腹膜透析（CCPD）は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査