

表 2061 HDF希釈方法 体重減少率(%)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	10 (23.3)	33 (76.7)			43 (100.0)		10	53
1.0～ (%)	16 (17.0)	78 (83.0)			94 (100.0)		17	111
2.0～ (%)	39 (17.1)	189 (82.9)			228 (100.0)		44	272
3.0～ (%)	68 (13.0)	454 (86.8)		1 (0.2)	523 (100.0)		99	622
4.0～ (%)	97 (13.8)	605 (85.8)	1 (0.1)	2 (0.3)	705 (100.0)		137	842
5.0～ (%)	61 (11.2)	483 (88.8)			544 (100.0)		97	641
6.0～ (%)	36 (12.1)	260 (87.2)	2 (0.7)		298 (100.0)		56	354
7.0～ (%)	19 (18.4)	84 (81.6)			103 (100.0)		18	121
8.0～ (%)	4 (11.8)	30 (88.2)			34 (100.0)		8	42
9.0～ (%)		13 (100.0)			13 (100.0)		4	17
合計 (%)	350 (13.5)	2,229 (86.2)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,585 (100.0)		490	3,075
記載なし (%)	1 (2.5)	39 (97.5)			40 (100.0)		20	60
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	4.41	4.61	5.84	4.24	4.58		4.58	4.58
標準偏差	1.65	1.57	1.44	0.50	1.58		1.61	1.58

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査