

表 580 糖尿病の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2,489 (34.5)	4,735 (65.5)	7,224 (100.0)	10	596	7,830
100～ (%)	8,114 (39.1)	12,654 (60.9)	20,768 (100.0)	27	1,927	22,722
120～ (%)	17,425 (45.5)	20,868 (54.5)	38,293 (100.0)	44	3,864	42,201
140～ (%)	21,909 (50.1)	21,849 (49.9)	43,758 (100.0)	40	4,861	48,659
160～ (%)	19,684 (54.4)	16,470 (45.6)	36,154 (100.0)	36	4,053	40,243
180～ (%)	13,105 (57.7)	9,614 (42.3)	22,719 (100.0)	22	2,784	25,525
200～ (%)	7,186 (59.3)	4,931 (40.7)	12,117 (100.0)	18	1,588	13,723
220～ (%)	3,204 (59.6)	2,170 (40.4)	5,374 (100.0)	11	686	6,071
240～ (%)	1,299 (60.5)	847 (39.5)	2,146 (100.0)	4	250	2,400
260～ (%)	790 (56.8)	601 (43.2)	1,391 (100.0)	5	190	1,586
合計 (%)	95,205 (50.1)	94,739 (49.9)	189,944 (100.0)	217	20,799	210,960
記載なし (%)	34,699 (45.4)	41,687 (54.6)	76,386 (100.0)	141	22,621	99,148
総計 (%)	129,904 (48.8)	136,426 (51.2)	266,330 (100.0)	358	43,420	310,108
平均	160.11	150.84	155.49	159.32	159.23	155.86
標準偏差	35.43	35.35	35.69	43.09	35.89	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査