

表 604 糖尿病の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	337 (51.7)	315 (48.3)	652 (100.0)	1	102	755
0.0～ (%)	4,051 (53.6)	3,504 (46.4)	7,555 (100.0)	13	882	8,450
1.0～ (%)	20,498 (55.8)	16,259 (44.2)	36,757 (100.0)	53	4,215	41,025
2.0～ (%)	35,018 (53.0)	31,064 (47.0)	66,082 (100.0)	48	7,031	73,161
3.0～ (%)	16,295 (46.7)	18,626 (53.3)	34,921 (100.0)	16	3,173	38,110
4.0～ (%)	3,542 (40.7)	5,162 (59.3)	8,704 (100.0)	2	739	9,445
5.0～ (%)	706 (39.0)	1,102 (61.0)	1,808 (100.0)	1	149	1,958
6.0～ (%)	153 (41.5)	216 (58.5)	369 (100.0)		26	395
7.0～ (%)	31 (35.2)	57 (64.8)	88 (100.0)		7	95
8.0～ (%)	56 (37.6)	93 (62.4)	149 (100.0)		11	160
合計 (%)	80,687 (51.4)	76,398 (48.6)	157,085 (100.0)	134	16,335	173,554
記載なし (%)	1,151 (37.8)	1,892 (62.2)	3,043 (100.0)	24	1,588	4,655
総計 (%)	81,838 (51.1)	78,290 (48.9)	160,128 (100.0)	158	17,923	178,209
平均	2.41	2.58	2.50	2.00	2.39	2.49
標準偏差	1.00	1.11	1.06	0.88	1.00	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査