

表 605 糖尿病の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	1,705 (51.6)	1,597 (48.4)	3,302 (100.0)	6	388	3,696
1.0～ (%)	2,885 (48.7)	3,044 (51.3)	5,929 (100.0)	9	671	6,609
2.0～ (%)	7,605 (49.8)	7,669 (50.2)	15,274 (100.0)	20	1,627	16,921
3.0～ (%)	15,702 (50.0)	15,683 (50.0)	31,385 (100.0)	38	3,161	34,584
4.0～ (%)	21,261 (50.5)	20,820 (49.5)	42,081 (100.0)	23	4,311	46,415
5.0～ (%)	17,295 (52.5)	15,666 (47.5)	32,961 (100.0)	22	3,306	36,289
6.0～ (%)	8,991 (54.2)	7,611 (45.8)	16,602 (100.0)	12	1,813	18,427
7.0～ (%)	3,516 (55.0)	2,875 (45.0)	6,391 (100.0)	3	714	7,108
8.0～ (%)	1,112 (55.9)	877 (44.1)	1,989 (100.0)	1	205	2,195
9.0～ (%)	577 (53.8)	496 (46.2)	1,073 (100.0)		132	1,205
合計 (%)	80,649 (51.4)	76,338 (48.6)	156,987 (100.0)	134	16,328	173,449
記載なし (%)	1,189 (37.9)	1,952 (62.1)	3,141 (100.0)	24	1,595	4,760
総計 (%)	81,838 (51.1)	78,290 (48.9)	160,128 (100.0)	158	17,923	178,209
平均	4.58	4.48	4.53	3.96	4.53	4.53
標準偏差	1.66	1.63	1.64	1.64	1.70	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査