

表 620 糖尿病の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	2,035 (33.9)	3,970 (66.1)	6,005 (100.0)	9	440	6,454
100～ (%)	6,585 (38.3)	10,600 (61.7)	17,185 (100.0)	21	1,414	18,620
120～ (%)	13,974 (44.5)	17,454 (55.5)	31,428 (100.0)	33	2,854	34,315
140～ (%)	17,236 (49.0)	17,964 (51.0)	35,200 (100.0)	25	3,601	38,826
160～ (%)	15,251 (53.3)	13,342 (46.7)	28,593 (100.0)	25	2,965	31,583
180～ (%)	9,880 (56.1)	7,719 (43.9)	17,599 (100.0)	15	2,005	19,619
200～ (%)	5,229 (57.5)	3,864 (42.5)	9,093 (100.0)	8	1,108	10,209
220～ (%)	2,253 (56.5)	1,737 (43.5)	3,990 (100.0)	6	479	4,475
240～ (%)	910 (58.3)	651 (41.7)	1,561 (100.0)	2	170	1,733
260～ (%)	530 (53.0)	470 (47.0)	1,000 (100.0)	4	107	1,111
合計 (%)	73,883 (48.7)	77,771 (51.3)	151,654 (100.0)	148	15,143	166,945
記載なし (%)	26,575 (48.6)	28,105 (51.4)	54,680 (100.0)	82	7,264	62,026
総計 (%)	100,458 (48.7)	105,876 (51.3)	206,334 (100.0)	230	22,407	228,971
平均	158.74	150.17	154.34	154.93	158.46	154.71
標準偏差	34.86	35.12	35.25	43.03	35.28	35.28

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査