

表 834 心筋梗塞の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	5	2	7		1	8
(%)	(71.4)	(28.6)	(100.0)			
20～	206	39	245	3	40	288
(%)	(84.1)	(15.9)	(100.0)			
30～	700	100	800	10	123	933
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
40～	777	70	847	7	136	990
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
50～	662	50	712	8	119	839
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
60～	417	25	442	3	71	516
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
70～	214	7	221	2	36	259
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
80～	111	6	117	1	23	141
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
90～	48	3	51		10	61
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
100～	52	1	53		4	57
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
合計	3,192	303	3,495	34	563	4,092
(%)	(91.3)	(8.7)	(100.0)			
記載なし	2,168	214	2,382	32	2,435	4,849
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	51.12	43.66	50.47	46.79	50.71	50.47
標準偏差	17.92	14.84	17.80	14.47	17.42	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査