

表 837 心筋梗塞の既往 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	13	1	14		1	15
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
40～	278	52	330	3	42	375
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
60～	1,672	181	1,853	19	193	2,065
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
80～	1,072	72	1,144	8	144	1,296
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
90～	599	32	631	13	70	714
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
100～	280	22	302	2	43	347
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
120～	13	2	15	1	2	18
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
140～	1		1			1
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	3,929	362	4,291	46	495	4,832
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
記載なし	1,431	155	1,586	20	2,503	4,109
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
総計	5,360	517	5,877	66	2,998	8,941
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
平均	79.24	74.96	78.88	81.11	79.97	79.01
標準偏差	14.30	14.95	14.40	16.21	14.52	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査