

表 860 脳出血の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	105,475 (94.3)	6,336 (5.7)	111,811 (100.0)	382	23,116	135,309
0.2～ (%)	34,834 (93.5)	2,411 (6.5)	37,245 (100.0)	123	7,439	44,807
0.5～ (%)	17,377 (92.7)	1,361 (7.3)	18,738 (100.0)	65	3,954	22,757
1.0～ (%)	11,257 (92.2)	955 (7.8)	12,212 (100.0)	50	2,486	14,748
2.0～ (%)	6,832 (91.4)	639 (8.6)	7,471 (100.0)	32	1,502	9,005
4.0～ (%)	2,439 (91.8)	218 (8.2)	2,657 (100.0)	25	562	3,244
6.0～ (%)	1,194 (92.6)	95 (7.4)	1,289 (100.0)	13	274	1,576
8.0～ (%)	645 (90.5)	68 (9.5)	713 (100.0)	2	155	870
10.0～ (%)	805 (90.3)	86 (9.7)	891 (100.0)	6	137	1,034
15.0～ (%)	523 (91.8)	47 (8.2)	570 (100.0)	8	115	693
合計 (%)	181,381 (93.7)	12,216 (6.3)	193,597 (100.0)	706	39,740	234,043
記載なし (%)	38,541 (93.7)	2,595 (6.3)	41,136 (100.0)	206	34,723	76,065
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	0.62	0.80	0.63	1.09	0.61	0.63
標準偏差	1.93	2.29	1.95	3.10	1.73	1.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査