

表 861 脳出血の既往 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

透析前補正 カルシウム濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	893 (93.5)	62 (6.5)	955 (100.0)	4	183	1,142
7.0～ (%)	1,286 (95.3)	64 (4.7)	1,350 (100.0)	4	295	1,649
7.5～ (%)	4,905 (94.9)	261 (5.1)	5,166 (100.0)	18	1,215	6,399
8.0～ (%)	15,843 (94.6)	899 (5.4)	16,742 (100.0)	47	3,650	20,439
8.4～ (%)	4,643 (95.0)	244 (5.0)	4,887 (100.0)	16	969	5,872
8.5～ (%)	52,251 (94.5)	3,057 (5.5)	55,308 (100.0)	173	11,838	67,319
9.0～ (%)	63,749 (94.0)	4,075 (6.0)	67,824 (100.0)	251	13,929	82,004
9.5～ (%)	41,683 (93.4)	2,926 (6.6)	44,609 (100.0)	118	9,242	53,969
10.0～ (%)	5,093 (92.7)	400 (7.3)	5,493 (100.0)	18	1,087	6,598
10.1～ (%)	12,875 (92.1)	1,109 (7.9)	13,984 (100.0)	47	2,946	16,977
10.5～ (%)	6,185 (91.3)	586 (8.7)	6,771 (100.0)	24	1,475	8,270
11.0～ (%)	2,053 (89.4)	244 (10.6)	2,297 (100.0)	11	473	2,781
11.5～ (%)	711 (88.8)	90 (11.2)	801 (100.0)	6	166	973
12.0～ (%)	496 (87.0)	74 (13.0)	570 (100.0)	5	106	681
合計 (%)	212,666 (93.8)	14,091 (6.2)	226,757 (100.0)	742	47,574	275,073
記載なし (%)	7,256 (91.0)	720 (9.0)	7,976 (100.0)	170	26,889	35,035
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	9.18	9.30	9.19	9.22	9.18	9.19
標準偏差	0.74	0.80	0.74	0.80	0.74	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査