

表 866 脳出血の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (透析患者全体)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,955 (92.9)	454 (7.1)	6,409 (100.0)	39	1,382	7,830
100～ (%)	17,264 (93.5)	1,203 (6.5)	18,467 (100.0)	81	4,174	22,722
120～ (%)	32,304 (93.5)	2,260 (6.5)	34,564 (100.0)	133	7,504	42,201
140～ (%)	37,389 (93.9)	2,415 (6.1)	39,804 (100.0)	108	8,747	48,659
160～ (%)	31,027 (93.8)	2,053 (6.2)	33,080 (100.0)	100	7,063	40,243
180～ (%)	19,699 (94.1)	1,241 (5.9)	20,940 (100.0)	44	4,541	25,525
200～ (%)	10,558 (94.3)	637 (5.7)	11,195 (100.0)	35	2,493	13,723
220～ (%)	4,618 (93.6)	317 (6.4)	4,935 (100.0)	10	1,126	6,071
240～ (%)	1,851 (93.8)	122 (6.2)	1,973 (100.0)	5	422	2,400
260～ (%)	1,190 (93.6)	81 (6.4)	1,271 (100.0)	8	307	1,586
合計 (%)	161,855 (93.8)	10,783 (6.2)	172,638 (100.0)	563	37,759	210,960
記載なし (%)	58,067 (93.5)	4,028 (6.5)	62,095 (100.0)	349	36,704	99,148
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	155.95	154.61	155.87	149.60	155.92	155.86
標準偏差	35.61	36.34	35.66	38.51	36.04	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査