

表 869 脳出血の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (透析患者全体)

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	31 (100.0)		31 (100.0)		9	40
60～ (%)	333 (93.8)	22 (6.2)	355 (100.0)	2	76	433
80～ (%)	2,581 (93.3)	186 (6.7)	2,767 (100.0)	14	557	3,338
100～ (%)	13,548 (93.0)	1,012 (7.0)	14,560 (100.0)	56	2,991	17,607
120～ (%)	41,300 (93.5)	2,854 (6.5)	44,154 (100.0)	157	8,960	53,271
140～ (%)	63,024 (93.8)	4,150 (6.2)	67,174 (100.0)	216	13,432	80,822
160～ (%)	45,236 (94.1)	2,830 (5.9)	48,066 (100.0)	157	9,972	58,195
180～ (%)	17,282 (94.0)	1,096 (6.0)	18,378 (100.0)	62	3,784	22,224
200～ (%)	4,312 (94.0)	274 (6.0)	4,586 (100.0)	13	947	5,546
220～ (%)	913 (94.6)	52 (5.4)	965 (100.0)	2	193	1,160
合計 (%)	188,560 (93.8)	12,476 (6.2)	201,036 (100.0)	679	40,921	242,636
記載なし (%)	31,362 (93.1)	2,335 (6.9)	33,697 (100.0)	233	33,542	67,472
総計 (%)	219,922 (93.7)	14,811 (6.3)	234,733 (100.0)	912	74,463	310,108
平均	151.17	150.06	151.10	149.57	151.29	151.13
標準偏差	24.20	24.28	24.21	25.04	24.32	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査