

表 888 脳出血の既往 体重減少量(kg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	554 (91.1)	54 (8.9)	608 (100.0)	3	144	755
0.0～ (%)	6,179 (88.9)	771 (11.1)	6,950 (100.0)	40	1,460	8,450
1.0～ (%)	30,855 (91.1)	3,011 (8.9)	33,866 (100.0)	127	7,032	41,025
2.0～ (%)	56,474 (93.2)	4,106 (6.8)	60,580 (100.0)	177	12,404	73,161
3.0～ (%)	29,879 (94.4)	1,763 (5.6)	31,642 (100.0)	91	6,377	38,110
4.0～ (%)	7,435 (95.3)	363 (4.7)	7,798 (100.0)	13	1,634	9,445
5.0～ (%)	1,536 (94.9)	82 (5.1)	1,618 (100.0)	3	337	1,958
6.0～ (%)	326 (96.4)	12 (3.6)	338 (100.0)	1	56	395
7.0～ (%)	73 (96.1)	3 (3.9)	76 (100.0)		19	95
8.0～ (%)	131 (95.6)	6 (4.4)	137 (100.0)	1	22	160
合計 (%)	133,442 (92.9)	10,171 (7.1)	143,613 (100.0)	456	29,485	173,554
記載なし (%)	1,703 (91.0)	168 (9.0)	1,871 (100.0)	50	2,734	4,655
総計 (%)	135,145 (92.9)	10,339 (7.1)	145,484 (100.0)	506	32,219	178,209
平均	2.51	2.27	2.49	2.28	2.48	2.49
標準偏差	1.06	1.02	1.05	1.15	1.03	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査