

表 892 脳出血の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	57 (90.5)	6 (9.5)	63 (100.0)		13	76
2～ (%)	1,186 (86.2)	190 (13.8)	1,376 (100.0)	7	273	1,656
4～ (%)	5,612 (87.4)	809 (12.6)	6,421 (100.0)	26	1,348	7,795
6～ (%)	18,178 (91.4)	1,701 (8.6)	19,879 (100.0)	80	4,047	24,006
8～ (%)	35,501 (92.5)	2,860 (7.5)	38,361 (100.0)	136	7,618	46,115
10～ (%)	37,109 (93.5)	2,583 (6.5)	39,692 (100.0)	115	8,227	48,034
12～ (%)	23,245 (94.3)	1,394 (5.7)	24,639 (100.0)	58	5,057	29,754
14～ (%)	9,495 (95.0)	503 (5.0)	9,998 (100.0)	21	2,017	12,036
16～ (%)	3,244 (95.8)	142 (4.2)	3,386 (100.0)	11	703	4,100
合計 (%)	133,627 (92.9)	10,188 (7.1)	143,815 (100.0)	454	29,303	173,572
記載なし (%)	1,518 (91.0)	151 (9.0)	1,669 (100.0)	52	2,916	4,637
総計 (%)	135,145 (92.9)	10,339 (7.1)	145,484 (100.0)	506	32,219	178,209
平均	10.34	9.66	10.29	9.74	10.31	10.29
標準偏差	2.78	2.80	2.78	2.77	2.81	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査