

表 907 脳出血の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (100.0)		27 (100.0)		8	35
60～ (%)	210 (93.3)	15 (6.7)	225 (100.0)	2	44	271
80～ (%)	1,830 (93.0)	137 (7.0)	1,967 (100.0)	9	401	2,377
100～ (%)	10,122 (92.6)	814 (7.4)	10,936 (100.0)	45	2,174	13,155
120～ (%)	32,396 (93.2)	2,353 (6.8)	34,749 (100.0)	116	6,711	41,576
140～ (%)	50,506 (93.7)	3,405 (6.3)	53,911 (100.0)	171	10,121	64,203
160～ (%)	36,732 (94.0)	2,352 (6.0)	39,084 (100.0)	130	7,629	46,843
180～ (%)	14,159 (94.1)	886 (5.9)	15,045 (100.0)	51	2,906	18,002
200～ (%)	3,549 (93.8)	233 (6.2)	3,782 (100.0)	13	720	4,515
220～ (%)	712 (94.8)	39 (5.2)	751 (100.0)	2	141	894
合計 (%)	150,243 (93.6)	10,234 (6.4)	160,477 (100.0)	539	30,855	191,871
記載なし (%)	24,843 (93.5)	1,720 (6.5)	26,563 (100.0)	185	10,352	37,100
総計 (%)	175,086 (93.6)	11,954 (6.4)	187,040 (100.0)	724	41,207	228,971
平均	151.76	150.21	151.66	150.66	151.57	151.64
標準偏差	23.97	24.09	23.98	25.34	24.17	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査