

表 922 脳出血の既往 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	78	5	83	1	8	92
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
3.0～	1,682	134	1,816	4	462	2,282
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
3.5～	1,919	126	2,045	6	428	2,479
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
4.0～	20,082	1,287	21,369	70	4,995	26,434
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
4.5～	3,100	163	3,263	3	582	3,848
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
5.0～	3,158	151	3,309	3	720	4,032
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
5.5～	186	8	194		24	218
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
6.0～	248	7	255	1	28	284
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
6.5～	15		15		2	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
7.0～	30	1	31		5	36
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
合計	30,498	1,882	32,380	88	7,254	39,722
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
記載なし	23	4	27	1	196	224
(%)	(85.2)	(14.8)	(100.0)			
総計	30,521	1,886	32,407	89	7,450	39,946
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
平均	4.11	4.04	4.10	3.98	4.08	4.10
標準偏差	0.51	0.48	0.51	0.45	0.48	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査