

表 927 脳出血の既往 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	465 (92.3)	39 (7.7)	504 (100.0)	3	80	587
1.0～ (%)	814 (91.1)	80 (8.9)	894 (100.0)	3	194	1,091
2.0～ (%)	2,334 (92.8)	180 (7.2)	2,514 (100.0)	4	512	3,030
3.0～ (%)	5,361 (94.0)	343 (6.0)	5,704 (100.0)	13	1,176	6,893
4.0～ (%)	7,267 (93.8)	477 (6.2)	7,744 (100.0)	17	1,616	9,377
5.0～ (%)	5,740 (94.4)	342 (5.6)	6,082 (100.0)	14	1,328	7,424
6.0～ (%)	2,887 (94.6)	165 (5.4)	3,052 (100.0)	6	667	3,725
7.0～ (%)	1,110 (94.9)	60 (5.1)	1,170 (100.0)		238	1,408
8.0～ (%)	352 (93.6)	24 (6.4)	376 (100.0)	1	59	436
9.0～ (%)	151 (95.0)	8 (5.0)	159 (100.0)		31	190
合計 (%)	26,481 (93.9)	1,718 (6.1)	28,199 (100.0)	61	5,901	34,161
記載なし (%)	153 (89.0)	19 (11.0)	172 (100.0)	11	627	810
総計 (%)	26,634 (93.9)	1,737 (6.1)	28,371 (100.0)	72	6,528	34,971
平均	4.60	4.44	4.59	4.28	4.61	4.59
標準偏差	1.59	1.61	1.59	1.63	1.54	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査