

表 945 脳出血の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	2 (100.0)		2 (100.0)			2
60～ (%)	91 (94.8)	5 (5.2)	96 (100.0)		19	115
80～ (%)	492 (94.4)	29 (5.6)	521 (100.0)	4	90	615
100～ (%)	2,208 (94.4)	132 (5.6)	2,340 (100.0)	6	454	2,800
120～ (%)	5,958 (94.5)	349 (5.5)	6,307 (100.0)	17	1,315	7,639
140～ (%)	8,927 (94.1)	555 (5.9)	9,482 (100.0)	16	1,935	11,433
160～ (%)	6,443 (94.4)	379 (5.6)	6,822 (100.0)	19	1,467	8,308
180～ (%)	2,421 (93.4)	170 (6.6)	2,591 (100.0)	7	556	3,154
200～ (%)	640 (95.0)	34 (5.0)	674 (100.0)		148	822
220～ (%)	171 (94.5)	10 (5.5)	181 (100.0)		35	216
合計 (%)	27,353 (94.3)	1,663 (5.7)	29,016 (100.0)	69	6,019	35,104
記載なし (%)	3,168 (93.4)	223 (6.6)	3,391 (100.0)	20	1,431	4,842
総計 (%)	30,521 (94.2)	1,886 (5.8)	32,407 (100.0)	89	7,450	39,946
平均	150.50	151.16	150.54	147.42	151.32	150.67
標準偏差	25.08	24.92	25.07	26.03	24.88	25.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査