

表 1033 脳梗塞の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	103 (78.6)	28 (21.4)	131 (100.0)	1	14	146
1.5～ (%)	489 (76.3)	152 (23.7)	641 (100.0)	9	121	771
2.0～ (%)	1,924 (70.6)	800 (29.4)	2,724 (100.0)	26	429	3,179
2.5～ (%)	7,480 (72.1)	2,893 (27.9)	10,373 (100.0)	64	1,713	12,150
3.0～ (%)	33,972 (76.8)	10,272 (23.2)	44,244 (100.0)	184	7,654	52,082
3.5～ (%)	74,738 (82.8)	15,506 (17.2)	90,244 (100.0)	343	16,548	107,135
4.0～ (%)	29,219 (86.6)	4,539 (13.4)	33,758 (100.0)	95	6,653	40,506
4.5～ (%)	1,766 (89.1)	216 (10.9)	1,982 (100.0)	10	370	2,362
5.0～ (%)	134 (84.8)	24 (15.2)	158 (100.0)	1	13	172
合計 (%)	149,825 (81.3)	34,430 (18.7)	184,255 (100.0)	733	33,515	218,503
記載なし (%)	4,540 (81.0)	1,062 (19.0)	5,602 (100.0)	67	4,799	10,468
総計 (%)	154,365 (81.3)	35,492 (18.7)	189,857 (100.0)	800	38,314	228,971
平均	3.62	3.49	3.60	3.49	3.62	3.60
標準偏差	0.44	0.46	0.44	0.52	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査