

表 1081 脳梗塞の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		2	7
20～ (%)	81 (83.5)	16 (16.5)	97 (100.0)		24	121
40～ (%)	1,834 (79.9)	461 (20.1)	2,295 (100.0)	7	378	2,680
60～ (%)	10,336 (82.4)	2,210 (17.6)	12,546 (100.0)	36	2,390	14,972
80～ (%)	6,367 (84.8)	1,137 (15.2)	7,504 (100.0)	15	1,484	9,003
90～ (%)	3,805 (85.6)	641 (14.4)	4,446 (100.0)	9	862	5,317
100～ (%)	1,975 (87.1)	293 (12.9)	2,268 (100.0)	4	429	2,701
120～ (%)	121 (85.8)	20 (14.2)	141 (100.0)		28	169
140～ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)	10 (100.0)	1	1	12
合計 (%)	24,533 (83.7)	4,779 (16.3)	29,312 (100.0)	72	5,598	34,982
記載なし (%)	2,869 (80.1)	711 (19.9)	3,580 (100.0)	12	1,372	4,964
総計 (%)	27,402 (83.3)	5,490 (16.7)	32,892 (100.0)	84	6,970	39,946
平均	79.45	77.36	79.11	77.90	79.53	79.17
標準偏差	14.71	14.66	14.72	18.90	14.53	14.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査