

表 1104 脳梗塞の既往 ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

ヘモグロビン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
5未満	5	1	6		1	7
(%)	(83.3)	(16.7)	(100.0)			
5～	9	1	10		4	14
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
6～	19	4	23		5	28
(%)	(82.6)	(17.4)	(100.0)			
7～	89	15	104		20	124
(%)	(85.6)	(14.4)	(100.0)			
8～	239	47	286	4	54	344
(%)	(83.6)	(16.4)	(100.0)			
9～	712	81	793	8	102	903
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
10～	1,311	172	1,483	3	220	1,706
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
11～	1,349	159	1,508	8	193	1,709
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
12～	613	79	692	2	102	796
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
13～	169	29	198	1	38	237
(%)	(85.4)	(14.6)	(100.0)			
14～	62	10	72		7	79
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
合計	4,577	598	5,175	26	746	5,947
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
記載なし	647	136	783	11	2,200	2,994
(%)	(82.6)	(17.4)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	10.83	10.77	10.82	10.35	10.76	10.81
標準偏差	1.39	1.51	1.41	1.38	1.48	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査