

表 1110 脳梗塞の既往 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	3	1	4		1	5
(%)	(75.0)	(25.0)	(100.0)			
40～	16	7	23		2	25
(%)	(69.6)	(30.4)	(100.0)			
50～	142	23	165	1	21	187
(%)	(86.1)	(13.9)	(100.0)			
60～	662	97	759	5	86	850
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
70～	984	129	1,113	4	154	1,271
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
80～	810	104	914	4	106	1,024
(%)	(88.6)	(11.4)	(100.0)			
90～	386	47	433	2	46	481
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
100～	153	24	177	3	24	204
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
110～	40	6	46		6	52
(%)	(87.0)	(13.0)	(100.0)			
120～	18	1	19		1	20
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
合計	3,214	439	3,653	19	447	4,119
(%)	(88.0)	(12.0)	(100.0)			
記載なし	2,010	295	2,305	18	2,499	4,822
(%)	(87.2)	(12.8)	(100.0)			
総計	5,224	734	5,958	37	2,946	8,941
(%)	(87.7)	(12.3)	(100.0)			
平均	78.23	77.15	78.10	79.47	77.92	78.09
標準偏差	13.21	13.75	13.27	14.96	13.16	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査