

表 1164 四肢切断の有無 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	9,529 (90.5)	1,004 (9.5)	10,533 (100.0)	14	2,003	12,550
60～ (%)	7,032 (91.7)	639 (8.3)	7,671 (100.0)	12	1,442	9,125
70～ (%)	11,031 (92.9)	845 (7.1)	11,876 (100.0)	9	2,069	13,954
80～ (%)	15,671 (94.5)	909 (5.5)	16,580 (100.0)	10	3,093	19,683
90～ (%)	20,122 (96.0)	845 (4.0)	20,967 (100.0)	24	3,867	24,858
100～ (%)	21,684 (97.1)	652 (2.9)	22,336 (100.0)	35	4,224	26,595
110～ (%)	19,565 (98.1)	379 (1.9)	19,944 (100.0)	24	3,886	23,854
120～ (%)	14,252 (98.5)	214 (1.5)	14,466 (100.0)	18	2,854	17,338
130～ (%)	7,904 (99.1)	69 (0.9)	7,973 (100.0)	8	1,627	9,608
140～ (%)	5,318 (99.2)	45 (0.8)	5,363 (100.0)	3	1,083	6,449
合計 (%)	132,108 (95.9)	5,601 (4.1)	137,709 (100.0)	157	26,148	164,014
記載なし (%)	8,831 (93.9)	569 (6.1)	9,400 (100.0)	12	4,783	14,195
総計 (%)	140,939 (95.8)	6,170 (4.2)	147,109 (100.0)	169	30,931	178,209
平均	99.32	82.51	98.63	98.49	99.31	98.74
標準偏差	25.72	24.99	25.91	26.57	26.23	25.96

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査