

表 1168 四肢切断の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析前リン濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	7,003 (94.2)	432 (5.8)	7,435 (100.0)	5	1,521	8,961
3.0~ (%)	8,720 (95.5)	408 (4.5)	9,128 (100.0)	12	1,840	10,980
3.5~ (%)	15,415 (96.2)	609 (3.8)	16,024 (100.0)	15	2,979	19,018
4.0~ (%)	22,777 (96.0)	945 (4.0)	23,722 (100.0)	25	4,445	28,192
4.5~ (%)	27,197 (96.6)	957 (3.4)	28,154 (100.0)	41	5,273	33,468
5.0~ (%)	27,334 (96.6)	959 (3.4)	28,293 (100.0)	34	5,482	33,809
5.5~ (%)	23,547 (96.6)	819 (3.4)	24,366 (100.0)	34	4,612	29,012
6.0~ (%)	3,979 (96.5)	144 (3.5)	4,123 (100.0)	4	801	4,928
6.1~ (%)	13,321 (96.7)	459 (3.3)	13,780 (100.0)	22	2,703	16,505
6.5~ (%)	11,619 (96.5)	425 (3.5)	12,044 (100.0)	23	2,310	14,377
7.0~ (%)	7,108 (96.2)	281 (3.8)	7,389 (100.0)	13	1,458	8,860
7.5~ (%)	4,326 (96.6)	152 (3.4)	4,478 (100.0)	7	874	5,359
8.0~ (%)	2,555 (96.1)	104 (3.9)	2,659 (100.0)	3	530	3,192
8.5~ (%)	1,617 (95.6)	75 (4.4)	1,692 (100.0)	2	329	2,023
9.0~ (%)	2,504 (95.6)	116 (4.4)	2,620 (100.0)	8	528	3,156
合計 (%)	179,022 (96.3)	6,885 (3.7)	185,907 (100.0)	248	35,685	221,840
記載なし (%)	3,105 (93.8)	204 (6.2)	3,309 (100.0)	12	3,810	7,131
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	5.20	5.11	5.20	5.45	5.20	5.20
標準偏差	1.42	1.54	1.42	1.49	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査