

表 1193 四肢切断の有無 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	489 (95.3)	24 (4.7)	513 (100.0)		74	587
1.0～ (%)	852 (95.1)	44 (4.9)	896 (100.0)	2	193	1,091
2.0～ (%)	2,435 (95.6)	111 (4.4)	2,546 (100.0)		484	3,030
3.0～ (%)	5,568 (96.4)	210 (3.6)	5,778 (100.0)	1	1,114	6,893
4.0～ (%)	7,550 (96.5)	273 (3.5)	7,823 (100.0)	3	1,551	9,377
5.0～ (%)	5,923 (96.5)	216 (3.5)	6,139 (100.0)		1,285	7,424
6.0～ (%)	2,966 (96.4)	110 (3.6)	3,076 (100.0)	1	648	3,725
7.0～ (%)	1,139 (96.6)	40 (3.4)	1,179 (100.0)		229	1,408
8.0～ (%)	375 (97.9)	8 (2.1)	383 (100.0)		53	436
9.0～ (%)	156 (96.9)	5 (3.1)	161 (100.0)		29	190
合計 (%)	27,453 (96.3)	1,041 (3.7)	28,494 (100.0)	7	5,660	34,161
記載なし (%)	263 (93.9)	17 (6.1)	280 (100.0)	1	529	810
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	4.59	4.44	4.59	3.78	4.62	4.59
標準偏差	1.59	1.64	1.60	1.91	1.53	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査