

表 1197 四肢切断の有無 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	13 (86.7)	2 (13.3)	15 (100.0)		4	19
0.4～ (%)	13 (76.5)	4 (23.5)	17 (100.0)		2	19
0.6～ (%)	69 (95.8)	3 (4.2)	72 (100.0)		12	84
0.8～ (%)	483 (93.1)	36 (6.9)	519 (100.0)		99	618
1.0～ (%)	2,295 (95.0)	120 (5.0)	2,415 (100.0)		501	2,916
1.2～ (%)	5,993 (96.0)	250 (4.0)	6,243 (100.0)		1,263	7,506
1.4～ (%)	7,243 (96.3)	281 (3.7)	7,524 (100.0)	2	1,446	8,972
1.6～ (%)	5,477 (96.9)	176 (3.1)	5,653 (100.0)	1	1,019	6,673
1.8～ (%)	2,929 (97.6)	71 (2.4)	3,000 (100.0)	2	538	3,540
2.0～ (%)	2,124 (97.5)	54 (2.5)	2,178 (100.0)	1	389	2,568
合計 (%)	26,639 (96.4)	997 (3.6)	27,636 (100.0)	6	5,273	32,915
記載なし (%)	1,077 (94.6)	61 (5.4)	1,138 (100.0)	2	916	2,056
総計 (%)	27,716 (96.3)	1,058 (3.7)	28,774 (100.0)	8	6,189	34,971
平均	1.55	1.47	1.54	1.73	1.53	1.54
標準偏差	0.31	0.30	0.31	0.18	0.31	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査