

表 1204 四肢切断の有無 透析前リン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前リン濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	913 (94.8)	50 (5.2)	963 (100.0)		170	1,133
3.0~ (%)	1,285 (96.3)	49 (3.7)	1,334 (100.0)		240	1,574
3.5~ (%)	2,307 (96.0)	97 (4.0)	2,404 (100.0)		445	2,849
4.0~ (%)	3,720 (96.6)	132 (3.4)	3,852 (100.0)		713	4,565
4.5~ (%)	4,631 (96.6)	161 (3.4)	4,792 (100.0)		920	5,712
5.0~ (%)	4,981 (96.9)	159 (3.1)	5,140 (100.0)	3	991	6,134
5.5~ (%)	4,300 (96.9)	136 (3.1)	4,436 (100.0)	1	862	5,299
6.0~ (%)	771 (96.9)	25 (3.1)	796 (100.0)		154	950
6.1~ (%)	2,604 (96.8)	85 (3.2)	2,689 (100.0)	1	554	3,244
6.5~ (%)	2,269 (96.3)	87 (3.7)	2,356 (100.0)		450	2,806
7.0~ (%)	1,454 (96.3)	56 (3.7)	1,510 (100.0)	1	264	1,775
7.5~ (%)	898 (97.0)	28 (3.0)	926 (100.0)		178	1,104
8.0~ (%)	528 (95.3)	26 (4.7)	554 (100.0)	1	96	651
8.5~ (%)	347 (96.7)	12 (3.3)	359 (100.0)		64	423
9.0~ (%)	549 (96.1)	22 (3.9)	571 (100.0)		111	682
合計 (%)	31,557 (96.6)	1,125 (3.4)	32,682 (100.0)	7	6,212	38,901
記載なし (%)	202 (91.4)	19 (8.6)	221 (100.0)	2	822	1,045
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	5.35	5.32	5.35	6.23	5.37	5.36
標準偏差	1.42	1.55	1.43	1.11	1.41	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査