

表 1217 四肢切断の有無 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎 (%)	2,046 (99.1)	19 (0.9)	2,065 (100.0)	3	991	3,059
慢性腎盂腎炎 (%)	70 (97.2)	2 (2.8)	72 (100.0)		21	93
急速進行性糸球体腎炎 (%)	48 (98.0)	1 (2.0)	49 (100.0)		25	74
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	29 (100.0)		29 (100.0)		3	32
その他の分類不能の腎炎 (%)	57 (98.3)	1 (1.7)	58 (100.0)		27	85
多発性嚢胞腎 (%)	162 (100.0)		162 (100.0)	1	80	243
腎硬化症 (%)	730 (98.9)	8 (1.1)	738 (100.0)	6	339	1,083
悪性高血圧 (%)	71 (98.6)	1 (1.4)	72 (100.0)	1	34	107
糖尿病性腎症 (%)	1,741 (96.5)	63 (3.5)	1,804 (100.0)	4	958	2,766
SLE腎炎 (%)	42 (100.0)		42 (100.0)		20	62
アミロイド腎 (%)	4 (100.0)		4 (100.0)		5	9
痛風腎 (%)	22 (100.0)		22 (100.0)	1	10	33
先天性代謝異常による腎不全 (%)	12 (100.0)		12 (100.0)	1	5	18
腎・尿路結核 (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
腎・尿路結石 (%)	13 (100.0)		13 (100.0)		3	16
腎・尿路腫瘍 (%)	9 (100.0)		9 (100.0)		5	14
閉塞性尿路障害 (%)	13 (92.9)	1 (7.1)	14 (100.0)		8	22
骨髄腫 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		3	8
腎形成不全 (%)	54 (98.2)	1 (1.8)	55 (100.0)		21	76
不明 (%)	508 (99.6)	2 (0.4)	510 (100.0)	3	327	840
再導入 (%)	30 (96.8)	1 (3.2)	31 (100.0)		20	51
その他 (%)	159 (98.8)	2 (1.2)	161 (100.0)		88	249
合計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
記載なし (%)						
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査