

表 1231 四肢切断の有無 リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

| リン濃度 | 切断なし | 切断あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-------------|-----------------|--------------|------------------|------|-------|-------|
| 3未満 (%) | 102 (95.3) | 5 (4.7) | 107 (100.0) | 1 | 18 | 126 |
| 3.0~ (%) | 235 (98.3) | 4 (1.7) | 239 (100.0) | 1 | 30 | 270 |
| 3.5~ (%) | 448 (98.7) | 6 (1.3) | 454 (100.0) | 3 | 68 | 525 |
| 4.0~ (%) | 649 (97.6) | 16 (2.4) | 665 (100.0) | 2 | 103 | 770 |
| 4.5~ (%) | 814 (98.4) | 13 (1.6) | 827 (100.0) | 3 | 91 | 921 |
| 5.0~ (%) | 813 (98.4) | 13 (1.6) | 826 (100.0) | 2 | 120 | 948 |
| 5.5~ (%) | 723 (98.5) | 11 (1.5) | 734 (100.0) | 2 | 103 | 839 |
| 6.0~ (%) | 118 (97.5) | 3 (2.5) | 121 (100.0) | | 17 | 138 |
| 6.1~ (%) | 403 (98.8) | 5 (1.2) | 408 (100.0) | 1 | 68 | 477 |
| 6.5~ (%) | 331 (98.8) | 4 (1.2) | 335 (100.0) | 2 | 62 | 399 |
| 7.0~ (%) | 186 (98.9) | 2 (1.1) | 188 (100.0) | | 24 | 212 |
| 7.5~ (%) | 127 (97.7) | 3 (2.3) | 130 (100.0) | 1 | 18 | 149 |
| 8.0~ (%) | 60 (100.0) | | 60 (100.0) | | 11 | 71 |
| 8.5~ (%) | 30 (96.8) | 1 (3.2) | 31 (100.0) | | 7 | 38 |
| 9.0~ (%) | 71 (100.0) | | 71 (100.0) | 1 | 17 | 89 |
| 合計 (%) | 5,110 (98.3) | 86 (1.7) | 5,196 (100.0) | 19 | 757 | 5,972 |
| 記載なし (%) | 716 (97.8) | 16 (2.2) | 732 (100.0) | 1 | 2,236 | 2,969 |
| 総計 (%) | 5,826 (98.3) | 102 (1.7) | 5,928 (100.0) | 20 | 2,993 | 8,941 |
| 平均 | 5.24 | 4.91 | 5.24 | 5.25 | 5.31 | 5.25 |
| 標準偏差 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.84 | 1.45 | 1.35 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査