

表 1236 四肢切断の有無 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	7 (100.0)		7 (100.0)		1	8
20～ (%)	239 (95.6)	11 (4.4)	250 (100.0)	1	37	288
30～ (%)	794 (98.0)	16 (2.0)	810 (100.0)	3	120	933
40～ (%)	845 (99.1)	8 (0.9)	853 (100.0)	2	135	990
50～ (%)	706 (98.2)	13 (1.8)	719 (100.0)	3	117	839
60～ (%)	447 (99.6)	2 (0.4)	449 (100.0)	1	66	516
70～ (%)	221 (97.8)	5 (2.2)	226 (100.0)		33	259
80～ (%)	119 (99.2)	1 (0.8)	120 (100.0)		21	141
90～ (%)	51 (98.1)	1 (1.9)	52 (100.0)		9	61
100～ (%)	53 (100.0)		53 (100.0)		4	57
合計 (%)	3,482 (98.4)	57 (1.6)	3,539 (100.0)	10	543	4,092
記載なし (%)	2,344 (98.1)	45 (1.9)	2,389 (100.0)	10	2,450	4,849
総計 (%)	5,826 (98.3)	102 (1.7)	5,928 (100.0)	20	2,993	8,941
平均	50.62	44.61	50.52	43.40	50.28	50.47
標準偏差	17.93	17.28	17.93	12.86	16.34	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査