

表 1240 四肢切断の有無 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
40未満	3		3		2	5
(%)	(100.0)		(100.0)			
40～	22		22		3	25
(%)	(100.0)		(100.0)			
50～	164	3	167		20	187
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
60～	747	12	759	4	87	850
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
70～	1,092	21	1,113	3	155	1,271
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
80～	896	19	915	3	106	1,024
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
90～	427	7	434		47	481
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
100～	175	4	179	2	23	204
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
110～	44	1	45		7	52
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
120～	19		19		1	20
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	3,589	67	3,656	12	451	4,119
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
記載なし	2,237	35	2,272	8	2,542	4,822
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	78.11	79.00	78.13	78.08	77.78	78.09
標準偏差	13.27	12.37	13.26	14.85	13.33	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査