

表 1246 大腿骨頸部骨折の既往 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	49,952 (97.2)	1,424 (2.8)	51,376 (100.0)	266	16,500	68,142
2年～ (%)	56,002 (95.8)	2,472 (4.2)	58,474 (100.0)	258	19,211	77,943
5年～ (%)	56,205 (94.9)	3,029 (5.1)	59,234 (100.0)	219	18,409	77,862
10年～ (%)	29,019 (95.1)	1,481 (4.9)	30,500 (100.0)	107	9,425	40,032
15年～ (%)	15,450 (95.7)	690 (4.3)	16,140 (100.0)	52	5,021	21,213
20年～ (%)	8,691 (96.1)	357 (3.9)	9,048 (100.0)	28	2,726	11,802
25年～ (%)	4,802 (95.3)	235 (4.7)	5,037 (100.0)	15	1,499	6,551
30年～ (%)	2,849 (93.3)	206 (6.7)	3,055 (100.0)	7	898	3,960
35年～ (%)	1,446 (89.4)	172 (10.6)	1,618 (100.0)	3	445	2,066
40年～ (%)	287 (83.4)	57 (16.6)	344 (100.0)		107	451
合計 (%)	224,703 (95.7)	10,123 (4.3)	234,826 (100.0)	955	74,241	310,022
不明 (%)	31 (100.0)		31 (100.0)	1	54	86
記載なし (%)						
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	7.29	8.58	7.34	6.05	7.15	7.29
標準偏差	7.48	8.36	7.53	6.62	7.39	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査