

表 1266 大腿骨頸部骨折の既往 PTH値(pg/mL)別（透析患者全体）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	9,398 (94.8)	520 (5.2)	9,918 (100.0)	28	1,927	11,873
20～ (%)	13,438 (95.1)	688 (4.9)	14,126 (100.0)	35	2,785	16,946
40～ (%)	14,244 (94.9)	758 (5.1)	15,002 (100.0)	47	2,967	18,016
60～ (%)	15,375 (95.6)	707 (4.4)	16,082 (100.0)	60	3,088	19,230
80～ (%)	15,604 (95.7)	696 (4.3)	16,300 (100.0)	73	3,240	19,613
100～ (%)	15,154 (95.7)	675 (4.3)	15,829 (100.0)	46	3,283	19,158
120～ (%)	14,445 (95.8)	634 (4.2)	15,079 (100.0)	71	3,072	18,222
140～ (%)	13,309 (95.7)	600 (4.3)	13,909 (100.0)	58	2,840	16,807
160～ (%)	12,049 (96.0)	508 (4.0)	12,557 (100.0)	54	2,562	15,173
180～ (%)	27,388 (96.3)	1,053 (3.7)	28,441 (100.0)	99	5,973	34,513
240～ (%)	345 (93.5)	24 (6.5)	369 (100.0)	1	74	444
241～ (%)	15,738 (96.3)	600 (3.7)	16,338 (100.0)	48	3,453	19,839
300～ (%)	9,217 (96.7)	319 (3.3)	9,536 (100.0)	28	1,962	11,526
360～ (%)	5,264 (95.9)	223 (4.1)	5,487 (100.0)	21	1,176	6,684
420～ (%)	3,099 (96.5)	114 (3.5)	3,213 (100.0)	12	700	3,925
480～ (%)	765 (96.0)	32 (4.0)	797 (100.0)	5	162	964
500～ (%)	1,222 (96.5)	44 (3.5)	1,266 (100.0)	4	294	1,564
540～ (%)	1,348 (95.7)	60 (4.3)	1,408 (100.0)	5	301	1,714
600～ (%)	2,237 (96.0)	94 (4.0)	2,331 (100.0)	5	463	2,799
800～ (%)	1,761 (95.9)	76 (4.1)	1,837 (100.0)	5	320	2,162
合計 (%)	191,400 (95.8)	8,425 (4.2)	199,825 (100.0)	705	40,642	241,172
記載なし (%)	4,041 (95.1)	210 (4.9)	4,251 (100.0)	46	2,087	6,384
総計 (%)	195,441 (95.8)	8,635 (4.2)	204,076 (100.0)	751	42,729	247,556
平均	172.34	163.54	171.97	171.57	173.20	172.17
標準偏差	163.74	189.98	164.94	188.85	158.47	163.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査