

表 1303 大腿骨頸部骨折の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	85 (95.5)	4 (4.5)	89 (100.0)		11	100
0.4～ (%)	139 (93.3)	10 (6.7)	149 (100.0)	2	16	167
0.6～ (%)	618 (94.9)	33 (5.1)	651 (100.0)	3	120	774
0.8～ (%)	3,560 (95.2)	178 (4.8)	3,738 (100.0)	19	747	4,504
1.0～ (%)	14,749 (95.8)	649 (4.2)	15,398 (100.0)	67	2,863	18,328
1.2～ (%)	33,253 (95.9)	1,437 (4.1)	34,690 (100.0)	157	6,804	41,651
1.4～ (%)	36,690 (95.6)	1,706 (4.4)	38,396 (100.0)	152	7,588	46,136
1.6～ (%)	23,377 (94.6)	1,322 (5.4)	24,699 (100.0)	97	4,839	29,635
1.8～ (%)	11,070 (94.3)	671 (5.7)	11,741 (100.0)	38	2,412	14,191
2.0～ (%)	6,328 (93.7)	425 (6.3)	6,753 (100.0)	17	1,596	8,366
合計 (%)	129,869 (95.3)	6,435 (4.7)	136,304 (100.0)	552	26,996	163,852
記載なし (%)	8,692 (93.3)	628 (6.7)	9,320 (100.0)	33	5,004	14,357
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	1.48	1.52	1.48	1.44	1.49	1.48
標準偏差	0.29	0.31	0.29	0.27	0.30	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査