

表 1332 大腿骨頸部骨折の既往 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学 (%)	37 (97.4)	1 (2.6)	38 (100.0)		4	42
私立大学 (%)	136 (95.1)	7 (4.9)	143 (100.0)	4	26	173
国立 (%)	22 (91.7)	2 (8.3)	24 (100.0)		12	36
県市町村立 (%)	1,159 (96.1)	47 (3.9)	1,206 (100.0)		567	1,773
社会保険 (%)	281 (94.9)	15 (5.1)	296 (100.0)		23	319
厚生連 (%)	601 (95.5)	28 (4.5)	629 (100.0)	1	383	1,013
その他公的 (%)	529 (97.4)	14 (2.6)	543 (100.0)	8	143	694
私立総合 (%)	942 (95.5)	44 (4.5)	986 (100.0)		107	1,093
私立 (%)	7,701 (95.5)	361 (4.5)	8,062 (100.0)	6	1,947	10,015
私立診療所 (%)	19,770 (96.9)	641 (3.1)	20,411 (100.0)	20	4,357	24,788
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査