

表 1344 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	3		3			3
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	53	6	59		11	70
(%)	(89.8)	(10.2)	(100.0)			
30～	1,786	182	1,968	6	418	2,392
(%)	(90.8)	(9.2)	(100.0)			
40～	4,972	311	5,283	6	1,135	6,424
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
50～	2,902	126	3,028	3	690	3,721
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
60～	1,001	33	1,034	1	224	1,259
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
70～	311	6	317		59	376
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
80～	121	2	123		23	146
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
90～	23	1	24		3	27
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
100～	2		2		3	5
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	3		3		1	4
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～						
(%)						
合計	11,177	667	11,844	16	2,567	14,427
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
記載なし	58	7	65	2	258	325
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
総計	11,235	674	11,909	18	2,825	14,752
(%)	(94.3)	(5.7)	(100.0)			
平均	49.03	45.35	48.83	44.94	48.82	48.82
標準偏差	10.22	8.95	10.18	9.25	10.00	10.15

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査