

表 1347 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	31 (96.9)	1 (3.1)	32 (100.0)		7	39
0.0～ (%)	493 (91.1)	48 (8.9)	541 (100.0)	1	117	659
1.0～ (%)	3,016 (92.3)	251 (7.7)	3,267 (100.0)	6	686	3,959
2.0～ (%)	4,792 (94.6)	275 (5.4)	5,067 (100.0)	6	1,131	6,204
3.0～ (%)	1,437 (96.7)	49 (3.3)	1,486 (100.0)		305	1,791
4.0～ (%)	171 (97.7)	4 (2.3)	175 (100.0)		38	213
5.0～ (%)	18 (100.0)		18 (100.0)		7	25
6.0～ (%)	6 (100.0)		6 (100.0)		1	7
7.0～ (%)	2 (100.0)		2 (100.0)		1	3
8.0～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)		1	8
合計 (%)	9,973 (94.1)	628 (5.9)	10,601 (100.0)	13	2,294	12,908
記載なし (%)	56 (88.9)	7 (11.1)	63 (100.0)	2	222	287
総計 (%)	10,029 (94.0)	635 (6.0)	10,664 (100.0)	15	2,516	13,195
平均	2.24	1.97	2.22	1.98	2.22	2.22
標準偏差	0.84	0.75	0.84	0.53	0.87	0.84

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査