

表 1354 大腿骨頸部骨折の既往 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	27	3	30		9	39
(%)	(90.0)	(10.0)	(100.0)			
20～	246	17	263		46	309
(%)	(93.5)	(6.5)	(100.0)			
30～	1,304	74	1,378	2	273	1,653
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
40～	3,787	191	3,978	5	802	4,785
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
50～	6,592	256	6,848	3	1,467	8,318
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
60～	7,015	247	7,262	11	1,531	8,804
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
70～	4,766	172	4,938	7	1,141	6,086
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
80～	2,244	68	2,312	2	517	2,831
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
90～	828	30	858		193	1,051
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
100～	222	9	231		48	279
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
110～	52	2	54		20	74
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
120～	15	1	16		4	20
(%)	(93.8)	(6.3)	(100.0)			
合計	27,098	1,070	28,168	30	6,051	34,249
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
記載なし	118	15	133	3	586	722
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
総計	27,216	1,085	28,301	33	6,637	34,971
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
平均	62.21	59.86	62.12	61.27	62.77	62.23
標準偏差	15.05	15.87	15.09	13.82	15.08	15.08

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査