

表 1395 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	24	1	25		2	27
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
14～	65	1	66	1	4	71
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
16～	203	12	215		13	228
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
18～	554	13	567	6	54	627
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
20～	1,007	25	1,032	9	99	1,140
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
22～	1,089	20	1,109	6	146	1,261
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
24～	808	17	825	5	78	908
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
26～	505	4	509	5	47	561
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
28～	269		269	1	32	302
(%)	(100.0)		(100.0)			
30～	192		192	2	26	220
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	4,716	93	4,809	35	501	5,345
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
記載なし	1,015	41	1,056	20	2,520	3,596
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
平均	23.15	21.50	23.12	23.30	23.39	23.15
標準偏差	3.61	3.00	3.61	3.54	3.51	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査