

表 1413 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 治療方法別(腹膜透析の経験があるか現在施行している患者)

治療方法	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	5,051 (91.2)	376 (6.8)	12 (0.2)	56 (1.0)	46 (0.8)	5,541 (100.0)	198	730	6,469
血液透析濾過 (%)	1,250 (90.5)	104 (7.5)	3 (0.2)	9 (0.7)	15 (1.1)	1,381 (100.0)	35	161	1,577
血液濾過 (%)	1 (100.0)				1 (100.0)	1 (100.0)			1
血液吸着透析 (%)	46 (79.3)	8 (13.8)	1 (1.7)		3 (5.2)	58 (100.0)	4	3	65
在宅血液透析 (%)	72 (98.6)	1 (1.4)				73 (100.0)		4	77
腹膜透析 (%)	5,769 (99.3)	36 (0.6)		3 (0.1)	3 (0.1)	5,811 (100.0)	67	3,063	8,941
合計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130
記載なし (%)									
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査