

表 1421 被囊性腹膜硬化症(EPS)の既往 降圧薬使用の有無別（腹膜透析の経験があるか現在施行している患者）

降圧薬使用の有無	なし	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往あり、ステロイド使用歴なし)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴あり)	あり(剥離手術既往なし、ステロイド使用歴なし)	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	3,219 (92.6)	202 (5.8)	10 (0.3)	28 (0.8)	18 (0.5)	3,477 (100.0)	98	168	3,743
あり (%)	8,724 (95.8)	288 (3.2)	5 (0.1)	38 (0.4)	49 (0.5)	9,104 (100.0)	181	804	10,089
合計 (%)	11,943 (94.9)	490 (3.9)	15 (0.1)	66 (0.5)	67 (0.5)	12,581 (100.0)	279	972	13,832
不明 (%)	73 (100.0)					73 (100.0)	17	2	92
記載なし (%)	173 (82.0)	35 (16.6)	1 (0.5)	2 (0.9)		211 (100.0)	8	2,987	3,206
総計 (%)	12,189 (94.7)	525 (4.1)	16 (0.1)	68 (0.5)	67 (0.5)	12,865 (100.0)	304	3,961	17,130

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査