

表 1504 降圧薬使用の有無 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

| 透析前補正<br>カルシウム濃度 | なし               | あり                | 合計                 | 不明   | 記載なし   | 総計      |
|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------|--------|---------|
| 7.0未満<br>(%)     | 271<br>(37.0)    | 462<br>(63.0)     | 733<br>(100.0)     | 3    | 138    | 874     |
| 7.0～<br>(%)      | 372<br>(33.9)    | 726<br>(66.1)     | 1,098<br>(100.0)   | 1    | 167    | 1,266   |
| 7.5～<br>(%)      | 1,281<br>(30.0)  | 2,992<br>(70.0)   | 4,273<br>(100.0)   | 16   | 682    | 4,971   |
| 8.0～<br>(%)      | 4,261<br>(30.3)  | 9,796<br>(69.7)   | 14,057<br>(100.0)  | 62   | 2,171  | 16,290  |
| 8.4～<br>(%)      | 1,177<br>(28.9)  | 2,897<br>(71.1)   | 4,074<br>(100.0)   | 20   | 582    | 4,676   |
| 8.5～<br>(%)      | 14,494<br>(30.9) | 32,381<br>(69.1)  | 46,875<br>(100.0)  | 209  | 6,818  | 53,902  |
| 9.0～<br>(%)      | 18,452<br>(32.2) | 38,775<br>(67.8)  | 57,227<br>(100.0)  | 277  | 7,732  | 65,236  |
| 9.5～<br>(%)      | 12,293<br>(33.1) | 24,858<br>(66.9)  | 37,151<br>(100.0)  | 143  | 5,110  | 42,404  |
| 10.0～<br>(%)     | 1,592<br>(34.6)  | 3,008<br>(65.4)   | 4,600<br>(100.0)   | 19   | 608    | 5,227   |
| 10.1～<br>(%)     | 4,100<br>(35.3)  | 7,506<br>(64.7)   | 11,606<br>(100.0)  | 45   | 1,626  | 13,277  |
| 10.5～<br>(%)     | 2,091<br>(37.3)  | 3,522<br>(62.7)   | 5,613<br>(100.0)   | 36   | 804    | 6,453   |
| 11.0～<br>(%)     | 762<br>(40.9)    | 1,103<br>(59.1)   | 1,865<br>(100.0)   | 17   | 283    | 2,165   |
| 11.5～<br>(%)     | 271<br>(41.7)    | 379<br>(58.3)     | 650<br>(100.0)     | 8    | 111    | 769     |
| 12.0～<br>(%)     | 219<br>(46.9)    | 248<br>(53.1)     | 467<br>(100.0)     | 3    | 69     | 539     |
| 合計<br>(%)        | 61,636<br>(32.4) | 128,653<br>(67.6) | 190,289<br>(100.0) | 859  | 26,901 | 218,049 |
| 記載なし<br>(%)      | 1,730<br>(30.3)  | 3,983<br>(69.7)   | 5,713<br>(100.0)   | 64   | 5,145  | 10,922  |
| 総計<br>(%)        | 63,366<br>(32.3) | 132,636<br>(67.7) | 196,002<br>(100.0) | 923  | 32,046 | 228,971 |
| 平均               | 9.23             | 9.17              | 9.19               | 9.23 | 9.17   | 9.18    |
| 標準偏差             | 0.76             | 0.72              | 0.74               | 0.77 | 0.77   | 0.74    |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査