

表 1528 降圧薬使用の有無 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	216 (42.6)	291 (57.4)	507 (100.0)	3	77	587
1.0～ (%)	398 (42.7)	535 (57.3)	933 (100.0)	4	154	1,091
2.0～ (%)	1,027 (39.0)	1,604 (61.0)	2,631 (100.0)	4	395	3,030
3.0～ (%)	2,284 (37.8)	3,756 (62.2)	6,040 (100.0)	8	845	6,893
4.0～ (%)	2,854 (34.8)	5,339 (65.2)	8,193 (100.0)	20	1,164	9,377
5.0～ (%)	2,109 (32.4)	4,404 (67.6)	6,513 (100.0)	17	894	7,424
6.0～ (%)	1,016 (31.1)	2,256 (68.9)	3,272 (100.0)	5	448	3,725
7.0～ (%)	384 (30.4)	878 (69.6)	1,262 (100.0)	2	144	1,408
8.0～ (%)	116 (29.4)	278 (70.6)	394 (100.0)		42	436
9.0～ (%)	43 (25.1)	128 (74.9)	171 (100.0)		19	190
合計 (%)	10,447 (34.9)	19,469 (65.1)	29,916 (100.0)	63	4,182	34,161
記載なし (%)	57 (31.1)	126 (68.9)	183 (100.0)	24	603	810
総計 (%)	10,504 (34.9)	19,595 (65.1)	30,099 (100.0)	87	4,785	34,971
平均	4.45	4.68	4.60	4.41	4.52	4.59
標準偏差	1.58	1.58	1.59	1.59	1.56	1.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査