

表 1568 降圧薬使用の有無 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	12 (30.0)	28 (70.0)	40 (100.0)		10	50
100～ (%)	23 (16.3)	118 (83.7)	141 (100.0)		19	160
120～ (%)	83 (19.9)	335 (80.1)	418 (100.0)	2	28	448
140～ (%)	126 (17.1)	610 (82.9)	736 (100.0)	8	62	806
160～ (%)	140 (17.6)	657 (82.4)	797 (100.0)	9	59	865
180～ (%)	142 (18.3)	633 (81.7)	775 (100.0)	7	51	833
200～ (%)	109 (21.0)	409 (79.0)	518 (100.0)	4	42	564
220～ (%)	61 (20.3)	239 (79.7)	300 (100.0)	2	16	318
240～ (%)	30 (20.8)	114 (79.2)	144 (100.0)		15	159
260～ (%)	34 (24.6)	104 (75.4)	138 (100.0)	1	10	149
合計 (%)	760 (19.0)	3,247 (81.0)	4,007 (100.0)	33	312	4,352
記載なし (%)	527 (24.3)	1,645 (75.7)	2,172 (100.0)	38	2,379	4,589
総計 (%)	1,287 (20.8)	4,892 (79.2)	6,179 (100.0)	71	2,691	8,941
平均	181.87	178.76	179.35	177.64	174.84	179.01
標準偏差	43.24	39.69	40.40	35.03	42.68	40.54

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査