

表 1594 喫煙の有無 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（透析患者全体）

透析前ヘモグロビン濃度	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
5未満	228	21	249	24	30	303
(%)	(91.6)	(8.4)	(100.0)			
5～	270	37	307	74	48	429
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
6～	784	100	884	93	183	1,160
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
7～	3,158	312	3,470	272	693	4,435
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
8～	10,410	1,126	11,536	886	2,132	14,554
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
9～	32,286	3,967	36,253	2,588	7,148	45,989
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
10～	64,897	8,542	73,439	5,204	15,269	93,912
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
11～	52,936	7,990	60,926	4,523	12,724	78,173
(%)	(86.9)	(13.1)	(100.0)			
12～	19,474	3,056	22,530	1,674	4,650	28,854
(%)	(86.4)	(13.6)	(100.0)			
13～	4,852	903	5,755	396	1,157	7,308
(%)	(84.3)	(15.7)	(100.0)			
14～	1,724	399	2,123	147	403	2,673
(%)	(81.2)	(18.8)	(100.0)			
合計	191,019	26,453	217,472	15,881	44,437	277,790
(%)	(87.8)	(12.2)	(100.0)			
記載なし	3,761	423	4,184	948	27,186	32,318
(%)	(89.9)	(10.1)	(100.0)			
総計	194,780	26,876	221,656	16,829	71,623	310,108
(%)	(87.9)	(12.1)	(100.0)			
平均	10.69	10.85	10.71	10.68	10.73	10.71
標準偏差	1.28	1.29	1.28	1.35	1.26	1.28

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査